

Fachärztlich, dermatologisches Gutachten über einen  
EPIKUTANTEST

geprüfte Substanz: Filz-Fix zum Nassfilzen  
Prüfkonzentration: 2%ig in Wasser  
Versuchspersonen: 50  
davon Allergiker: 9

Prinzip:

Der Epikutantest dient zum Nachweis einer primären Hautirritation bzw. einer Kontaktallergie, durch epikutanen Kontakt, örtlich und zeitlich begrenzt, mit der zu untersuchenden Substanz.

Methode:

Unter Verwendung eines handelsüblichen Testpflasters wird die zu prüfende Substanz auf die klinisch gesunde Haut aufgelegt und fixiert.  
Das Testpflaster wird nach 24 Stunden entfernt und das Testfeld beurteilt.  
Weitere Beurteilungen erfolgen nach 48 und 72 Stunden.

Testfeld:

Oberarm Innenseite oder Rücken

Beurteilung der Testergebnisse und Schlussfolgerungen im Hinblick auf die spätere Verwendung des Präparates:

Es fand sich weder nach 24 noch nach 48 Stunden eine positive oder zweifelhafte Reaktion, so dass sich aus diesem Test kein Hinweis für eine primäre Irritation oder eine Auslösung einer allergischen Reaktion ermitteln ließ.